



外皮用殺菌消毒剤
日本薬局方

クレゾール石ケン液

クレゾール石ケン液FM

Saponated Cresol Solution

500mL

発売元 株式会社 三恵薬品 愛知県豊橋市入船町21番地
製造販売元 株式会社 フジミ製薬所 大阪市東成区中本2丁目9番9号

貯法：遮光した気密容器

注意：長期保存により、色が濃くなることもある。
(クレゾールの物性による。)

使用期限：5年(表示の使用期限を参照すること)

2007年4月作成(第1版)

日本標準商品分類番号	872616.877325
承認番号	15800AMZ00281
薬価収載	1983年3月
販売開始	1983年3月
再評価結果	1982年8月

【禁忌(次の部位には使用しないこと)】

損傷皮膚〔吸収され、中毒症状を起こすおそれがある。〕

【組成・性状】

組成：1mL中 クレゾール 0.5mL含有(50vol%)。

添加物としてダイズ油、水酸化カリウムを含有する。

性状：本剤は黄褐色～赤褐色の粘稠性のある液で、クレゾール臭がある。
本剤は水、エタノール(95)又はグリセリンと混和する。
アルカリ性である。

【効能・効果】【用法・用量】

クレゾールとして、下記の濃度に希釈して使用する。

手指・皮膚の消毒、手術部位(手術野)の皮膚の消毒、医療機器の消毒、手術室・病室・家具・器具・物品などの消毒	0.5~1% (本剤の50~100倍希釈液)
排泄物の消毒	1.5%(本剤の33倍希釈液)
膣の洗浄	0.1%(本剤の500倍希釈液)

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は、使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

種類 \ 頻度	頻度不明
過敏症 ^{注)}	過敏症状(紅斑等)

注)このような場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

(1)投与経路

1) 経口投与しないこと。

(2)使用時

- 1) 眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水でよく洗い流すこと。
- 2) 原液又は濃厚液が皮膚に付着した場合には、刺激症状を起こすことがあるので、直ちに拭きとり石けん水と水でよく洗い流すこと。
- 3) 炎症又は易刺激性の部位に使用する場合には、正常の部位に使用するよりも低濃度とすることが望ましい。
- 4) 長期間又は広範囲に使用しないこと。

(3)調製時

- 1) 希釈する水にアルカリ土類金属塩、重金属塩、第二鉄塩、酸類が存在する場合、変化することがあるので注意すること。
- 2) 本剤は常水で希釈すると次第に混濁して沈澱することがあるが、このような場合には上澄み液を使用すること。

【薬効薬理】

本剤は使用濃度において抗酸菌を含む通常の細菌には有効であるが、芽胞及び大部分のウイルスに対する殺菌効果はほとんど期待できない。


製造番号

使用期限

JAN



GSI-RSS



ボトル
外装フィルム

金属
キャップ