

収れん・消炎・保護剤

日本薬局方
酸化亜鉛

Zinc Oxide
(亜鉛華)

酸化亜鉛「三恵」

500g

※製造販売元

X 株式会社 三恵薬品

愛知県豊橋市入船町21番地

製造番号

使用期限

※2006年3月改訂(第2版)
1995年4月改訂

| | |
|------------|------------|
| 日本標準商品分類番号 | 872649 |
| 承認番号 | (61AM)1958 |
| 薬価収載 | 1986年3月 |
| 販売開始 | 1986年3月 |

貯 法：気密容器・室温保存

【禁忌】(次の部位には使用しないこと)

1. 重度又は広範囲の熱傷〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。〕
2. 患部が湿潤している場合〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遅延させることがある。〕

【組成・性状】

1. 組成：1g中 日本薬局方酸化亜鉛1g含有
2. 性状：本品は、白色の無晶性の粉末で、におい及び味はない。
本品は、水、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。
本品は希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。
本品は空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。

【効能・効果】

軽度の皮膚病変の収れん・消炎・保護・緩和な防菌

【用法・用量】

- 外用散剤(散布剤)として15～100%
 - 軟膏剤・液剤(懸濁剤・リニメント剤・ローション剤等)として2～60%
- 上記濃度に調整し、いずれも症状に応じ1日1～数回患部に適用する。

【使用上の注意】

1. 副作用

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

| 種類 | 頻度 | 頻度不明 |
|-------------------|---------|------|
| 過敏症 ^{注)} | 過敏症状 | |
| 皮膚 ^{注)} | 発疹、刺激感等 | |

注) このような場合には使用を中止すること。

2. 適用上の注意

- (1) 誤って吸入しないように注意させること。
- (2) 眼には使用しないこと。

GS1-RSS



(01)14987344131115

JAN



4987344 131118