

日本標準商品分類番号	872633
承認番号等	22000AMX00155
薬価収載	2008年6月
販売開始	2008年8月

外用サルファ剤  
**スルファジアジンパスタ 5%**  
**「三 恵」**

貯 法: 遮光した気密容器

使用期限: ラベルに表示

Sulfadiazine Pasta 5%  
(スルファジアジン軟膏)**【禁 忌】(次の患者には投与しないこと)**

サルファ剤に対し過敏症の既往歴のある患者。

**【組成・性状】**

販 売 名	スルファジアジンパスタ5%「三恵」
成 分	スルファジアジン
含量(1g中)	50mg
色・剤形	白色の軟膏剤で、においはほとんどない

添加物

基剤: 日本薬局方マクロゴール4000, 日本薬局方マクロゴール400からなる水溶性基剤

**【効能・効果】**

〈適応菌種〉

本剤に感性のブドウ球菌属, 大腸菌

〈適応症〉

表在性皮膚感染症, 深在性皮膚感染症, 外傷・熱傷及び手術創等の二次感染, びらん・潰瘍の二次感染

**【用法・用量】**

通常, 症状により適量を1日1~数回直接患部に塗布又は無菌ガーゼにのばして貼付する。

〈用法・用量に関連する使用上の注意〉

本剤の使用にあたっては, 耐性菌の発現等を防ぐため, 原則として感受性を確認し, 疾病の治療上必要な最小限の期間の投与にとどめること。

**【使用上の注意】****1. 慎重投与(次の患者には慎重に投与すること)**

- (1)薬物過敏症の既往歴のある患者〔過敏症が増悪することがある。〕
- (2)光線過敏症の既往歴のある患者〔光線過敏症があらわれることがある。〕
- (3)エリテマトーデスの患者〔症状が悪化することがある。〕

**2. 重要な基本的注意**

感作されるおそれがあるので, 観察を十分に行い, 感作されたことを示す兆候(掻痒, 発赤, 腫脹, 丘疹, 小水疱等)が現れた場合には, 使用を中止すること。

**3. 副作用**

本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。

	頻 度 不 明
過敏症 <sup>注1)</sup>	発疹, 発赤, 腫脹, 光線過敏症等
菌交代現象 <sup>注1)</sup>	スルファジアジン耐性菌または非感受性菌による化膿性感染症
その他	内服, 注射等全身投与の場合と同様な副作用が現れることがあるので, 長期投与は避けること。

注1) このような症状があらわれた場合には使用を中止すること。

**4. 適用上の注意**


投与方法: 眼科用として使用しないこと。

**【有効成分に関する理化学的知見】**

一般名: Sulfadiazine (スルファジアジン)

化学名: N<sup>1</sup>-2-pyrimidinylsulfanilamide

構造式:

分子式: C<sub>10</sub>H<sub>10</sub>N<sub>4</sub>O<sub>2</sub>S

分子量: 250.27

融 点: 252~256℃

性 状: 白色~微黄色の結晶性の粉末で, においおよび味はない。ピリジンに溶けやすく, アセトンに溶けにくく, エタノールにきわめて溶けにくく, 水またはエーテルにほとんど溶けない。希塩酸, 水酸化ナトリウム試液またはアンモニア試液に溶ける。光によって徐々に着色する。

**【包装】**

500g

**【文献請求先】**株式会社 三恵薬品 品質管理室  
〒441-8033 愛知県豊橋市入船町21番地  
TEL <0532> 45-6136

製 造 販 売 元

株 式 会 社 **三 恵 薬 品**

〒441-8033 愛知県豊橋市入船町21番地